

## 令和2年度普及啓発部の活動報告

普及啓発部 理事 松原公雄

3月

令和2年は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大となりました。鎌ヶ谷市内においても感染症拡大防止を配慮し予定の市民まつり、産業フェスティバル、福祉健康フェアや、ふれあいまつり等のイベントが中止となりました。毎年、これらのイベントでのシルバー新規会員増強を目標に、PR用チラシの配布等を行ってきましたが昨年は達成することができず残念でした。以下に活動内容を報告します。



### 1. 普及啓発部月例会議の開催

### 2. 鎌シル便の発行

鎌シル便の企画、写真撮影、編集、など

### 3. 年報 シルバーかまがや発行

年報 シルバーかまがやの企画、編集会議、写真撮影などを行いました。

原稿を作成していただきました会員のみなさんには紙面をお借りしてお礼を申し上げます。

## 理事会報告

令和2年度第8回理事会を令和3年2月12日(金)午後1時30分から、東初富公民館にて開催。以下の件について承認及び協議をしました。

### I. 決議・承認事項

- 1) 令和2年度 補正予算について
- 2) 令和3年度 事業計画書(案)について
- 3) 令和3年度 収支予算(案)について
- 4) 会員の入会(案)について

### II. 協議事項

- 1) 令和3年度 年間予定表(案)について
- 2) その他

### III. 報告事項

- 1) 1月の実績報告について
- 2) 新規就業者の紹介及び退会者について
- 3) 各部会の事業報告について
- 4) その他

(入会者)	「新しい仲間です」	男性	2名	女性	1名	合計	3名
(退会者)	「お疲れさまでした」	男性	1名	女性	2名	合計	3名

**8月 自動車事故(物損)72歳男性**

【状 況】

道幅が狭い道路を走行中、左に寄り過ぎてタイヤが路肩の溝にはまってしまい、車両が左に傾きガードレールに当たり、左ドア部分を擦ってキズをつけてしまった物損事故です。

【原 因】

以前から本人は狭い道路なので常に注意して走行することは認識していましたが、通常的に運転している道路なので慣れている安心感があり、一寸の気の緩みがあって注意力が薄れてしまったことが事故の原因と思われます。

【対 策】

一般的に平常運転はマンネリ化になると同時に、慣れによって気の緩みが起き易くなり事故につながるが多くなります。

従って日頃からの体調管理は基より、特に道路状況が悪い所は細心の注意を払い、安全意識を強く持って安全運転に心掛けることが大切です。併せて日常から心身ともに健康体で就業できるよう、健康管理には心掛けておくことも大事です。

【ポイント】

- ① 日常作業のマンネリ化に注意しましょう(思い込み・気の緩みに注意)
- ② 作業前点検を必ず実施し安全確認をしましょう(指差呼称)
- ③ 運転は環境の変化に細心の注意を心掛けましょう(環境変化に注意)
- ④ 健康管理と健康維持に努めましょう(身体機能低下の認識)

**県内でも新型コロナウイルスのワクチン接種が始まる** (厚生労働省の資料等より)

1. スケジュール

時 期	対 象	人 数	時 期	対 象	人 数
2月中旬～	医療従事者(先行接種)	約4万人	4月以降	持病のある人	約820万人
3月～	その他の医療従事者	約470万人		高齢者施設などの従業者	約200万人
4月12日～	65歳以上の高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)	約3600万人(4月中の接種可能人数は55万人程度)	未定	60から64歳の人	約750万人
		<u>6月中迄に2回分の配送完了予定</u>		その他の人	

2. 接種費用は全額公費(無料)で行う

3. 市町村が定めた医療機関や公共施設などの接種会場で行われる予定

\* 入院中の方などは住所地以外での接種ができる見込み

4. 接種の流れ

- 1) 市区町村から事前に接種券とお知らせが届く。接種が受けられる場所を参考に接種会場を探す
- 2) 電話等での予約。接種時は接種券と本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参し接種会場へ
- 3) 3週間の間隔で2回接種

5. 新型コロナワクチン接種は本人の意志で決めるものであり強制ではありません

予防接種による感染症予防の効果と副反応\*1のリスクの両方を理解した上で決めるものです。

\*1 接種部位の痛み、頭痛、筋肉痛、アナフィラキシー(急速に全身に起こる特に強いアレルギー反応)など  
接種後、健康被害が生じた場合は予防接種法に基づく救済を受けることができる

注意点

血液さらさらの薬で抗凝固薬を飲まれている方は予診票でその種類が尋ねられる。

ワクチン接種は可能ですが筋肉注射なので接種後の出血に注意が必要

血液さらさらの薬で抗血小板薬(アスピリン等)を飲まれている方は通常通り接種を受けられる